

DEO OPTIMO MAXIMO UNI ET TRINO, VIRGINI DEIPARÆ
ET SANGTO LUCÆ ORTHODOXORUM MEDICORUM PATRONO.
QUESTIO MEDICA,
QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS MANE DISCUTIENDA
IN SCHOLIS MEDICORUM, DIE JOVIS XIV. DECEMBRIS MDCCXIX.

M. EMMANUELE MAURITIO DUVERNEY, Regio Anatomæ & Chirurgiæ in Horto Regio Parisiensi Professore designato, Doctore Medico, Præfide.

An multis in morbis elucescat corporis Mechanismus?

Nihil magis officis sapientiam & industriam probat, quam si opus suum ad propositum finem optime comparat. Illud vero in humano corpore mirè elucescit, cujus artificium eò præcipue spectat, ut in sua crassi & texturâ, quamvis alloquin corruptioni valde obnoxium perderet, & conservetur. Non male machinam quandam dixeris ad motus ususque speciales incredibili arte fabricatam, quæ juxta leges & consilia summi Opificis accuratâ proportionem, servatis gradibus, distinctoque temporum ordine in naturalibus actibus procedit. Non abimile exemplum, rude tamen, in vulgaribus machinis habemus. Hæc motibus ad certum finem tendentibus instruatæ sunt, quorum ratio, quantitas, determinationes à peculiari ipsarum fabricâ pendent, quod Mechanismus vocant. Sic in corpore vigenti & sano adeit motuum organicorum symmetria & harmonia, unde sequitur sanguinis & humorum circuli æqualitas, à debito fibrarum pulsu ac tono, & fluidorum quantitate, temperie, ac proportionem dependens. In variis autem animalibus variam organorum fabricam, & diversam liquidorum indolem miteris, nempe pro finis ad quem condita sunt, & usum quibus inservire debent diversitate. Ad hunc circuitum in corpore nostro sustinendum conspirant omnium partium structura, situs, connexio. Ex earum dispositione & mutuo consensu fluunt naturales animalesque functiones. Scilicet idonea conficiendo sanguini materia præparatur, dein sanguis ex eâ elicitur. Hic motu progrediendo, cum intestino teritur, attenuatur, commiscetur intimè; ab omnibus expurgatur sordibus nutritioni partium inservire habilis evadit. Ex tenuissimis particulis liquidum illud subtilissimum subministrat, quo sensuum & motuum organa vigent. Quamdiu ergo sanguis purus & integer liber corpus permeat, ac per vasa, nullo obstante impedimento, circuit, arcetur tum ipsius, tum manantem ex eo liquidorum infusio, stagnationes præcauent, ritè peraguntur secretiones, sic nullus linquitur liquidorum depravationi locus, & servato ea inter & solidas partes æquilibrio, stat rhythmus omnium functionum concentusque. His ita se habentibus corpus sanum merito nuncupatur. Notanda etiam particularis motus sanguinis in diversis partibus variatio. Hanc facit intelliges si modo æqualem, modo inæqualem impulsio in certas partes, per eas propulsionis, & ex his denique capillaris vim observes. Vis illa in immensum mutari potest. Id non solum deducas à tubulorum capacitate inæquali, varisque eorum superficiebus, directionibus, proportionibus, multiplicationibus. Ad diversam partium circumjacentium pressionem, & textus vasorum contractilibus attractionem aut relaxationem attende. Ipsam quoque liquorum indolem ac temperiem fere vividam fere segetem reputa, unde solidorum elater vel excitatur vel remittitur. Ex tot causarum actione multiplice, & vario concursu sequuntur multæ varietates. Sanguis è majoribus canalibus in plures minores ingreditur, præsertim autem tono, consentaneâ progreditur. Hujus præsertim ratione modo plus, modo minus in hac vel illâ parte premitur, exprimitur à quibusdam, ad alias majori vel minori quantitate aut impetu appellit. In his plus minus moratur. Variis denique modis urgetur, aut reprimitur. Inde secretionum quarundam major aut minor quantitas, celeritas. His positis deducitur facilis variorum morborum ætiologia. Insuper sensationes ad hoc homini date, ut quid salubre quid noxium sit compendiarè viâ intelligat. Sic famem quâ ad capiendos cibos, sitim quâ ad potulenta assumenda impellitur, morbos quotidianos dixeris at necessarios, imò certos remedi indices. His salubri incommodo urgentibus moneatur ea quæ deest ad reparandam sive solidorum, sive fluidorum partium læduntur profectui. Cave autem ne pro naturali sensatione habeas quod aliunde accessit, five ex imaginationis aut ipsius organi vici, five etiam, ut sepe fit, ex voluptatis nimia cupiditate. Adde quod experimur sepius, nimirum unâ parte laborante trahi subito in consensum vicinas, unde multoties mechanicum & naturale paratur remedi genus. Paucis id seleditque ex magnâ multitudine exemplis innotebit. Prælo est gravato ventriculo, & se aliqui fibrarum suarum motu expedito nienti, diaphragma succussibile opportunis per superiora nobis sarcinam ejectionis unâ cum mulsis abdominis contentibus; vel deorsum subito conatu prorumpens subiecta viscera valide premit, violento ictu, quantum licet, si quid ea molestat exturbare conans. Auxiliare etiam musculorum abdominis in parte & in excrementorum ejectione conatus valde utiles. Nec minus insignes partium mutui sibi operam præstantium in sternutatione & tussi motus. Nempe cavitatis abdominis subitâ ipsius musculorum contractione coarctatur, unde etiam sursum repellitur diaphragma. Sic pectus simul comprimentibus mulsis expirationi inventientibus valde angustatur. Pressis ergo undecumque pulmonibus aer forti exploditur impetu. Si nasi interiora humore quopiam viscentur, per ea prælo oris aditus protrahitur aer, & venti vehementer more pertransiens, ea verret & expurgabit. Queris quæ mechanici id fiat? Septum quod palati partem posteriorem occupat lingue radici admoventur, sic laryngis cum ore commercium prohibet. Sin autem oris cavitatis, aut palatum, aut faucium pars ima abstergi opus habent, id etiam efficitur ac per illas partes erampere coactus, dum palati septum, de quo jam, attollitur, & occludit accuratè nati ductum foramina, quæ in imam partem faucium desinunt & referuntur.

ICET corpus nostrum optime sit à supremo contextum artifice, eâ tamen lege vivimus ut propriis malis & alienâ experientiâ edocti, morborum mortisque nos vestigales sentiamus. Ad illa attendenti naturalis affliger de tot ac tantarum miserationum origine idea. Hanc firmat Religio, hominis nempe laborem assignat ex quâ inter alias clades fluxit pathematum animi incredibilis quædam & vix ratione compescenda rebellio. Hinc morborum morbiq; adferribus. Quantas enim strages edunt non refrænata pathemata! Habent tamen, saltem plurima, si intra legitimos fines continentur, tum ad ipsius corporis conservationem, tum ad societatis vinculum, suas à summo provido Creatore destinatas utilitates. Jam ipsi quibus reparatur alimentis corpus ad corruptionem & putredinem disponitur. In fermentationem proclivis sunt. Multas fordes relinquunt in corpore. Hoc ex alvinis fecibus aliisque excrementis patet; videmus autem post obitum sanguinem & humores, imò totum corpus solis ossibus exceptis, brevi temporis spatio putrescere. Excrementorum separatio, & ad certum tempus intra corpus retentio suo quidem more sanitati conducit, atque etiam necessaria est. Tamen facilem morbis anam præbet. Sepe enim morantur diutius, vel iusta proportionem non separantur, ex quo sequuntur multæ affectiones. Hæc inter alias maxime de causâ dicas nos interna morborum semina perpetuo fovere. Neque præterea mirum si machina tot constata tubulis, tot intricata filamentis, tot moribus diversis iisque in unum confpirantibus, exercita, infinitis propè modis lædatur ac tandem aliquando concidat & dissimulatur. Modò adaugeretur nimis solidorum elater, & contenta fluida pellit vehementius, modo debilitatur, & plus æquo remissus minus verberat quam par est. Sepe etiam iniuratis & à naturali ordine alienis morbus rapiuntur. Quin etiam liquores varia folent concipere vicia, sanguis maxime. Vel enim capite principiorum solutâ male coherens, vel ipsorum moleculæ crassissæ & spissitudine excedunt, vel crassi & indole mutâtæ aciores evadunt. Insuper actione mutua & reciproca ex solidorum anomalis perversuntur fluida, ex depravatione fluidorum solida perturbantur. Si affectio quæcunque de causâ utrobique genere (quot autem causæ tum ab assumptis, tum ab animi pathematis, tum ab externis corporibus insistant) perfundatur partium symmetria, turbatur sanguinis circuitus, secretiones vitiantur, functiones labefactantur, hinc morbus. Non tamen idè desperandum. Cum motuum naturalium directiones, modos, gradus, tempora mutari vides, cogita liquores ab indole sua delevisse, nativas solidorum oscillationes per turbatas intellige, latentemque pestem subodorare. Ad eam depellendam idonei ut plurimum instituntur motus, machinâ ipsâ sibi quantum potest organorum suorum viribus præstans auxilium ferente. Sic inter ea quæ pernecium corpori inferre aut minari videntur, salubria naturæ conamina sæpe sæpius dependens. Mirabilis sane organum effectum, qui est in nonnullis casibus obcurus si nec factis obvis, in aliis sopitus aut penitus extinctus videatur, in quibusdam conspicuus est & evidens, in præsertim qui genium morborum & naturæ in his natus ac molimina perspicere.

QUOD de morbo generatim dixit Sydenhamius cum esse conamen naturæ exterminationem materiæ morbificæ molientis, de multis reuera morbis affirmari potest. Exemplum à febre desumamus, morbo frequentissimo, qui non raro præsidio est. In eâ augetur motus sanguinis tum progressivus tum intensus. Spasmo qui plerumque febribus motus initia occupat angustatur primùm vaforum diametri, dein per eas increbescens cordis pulsus & ingeminatis arteriarum vibrationibus, valido abreptus impetu dividitur sanguis, attenuatur. Quin etiam sepiusmet ipsa simul ipsius partium sustentatione facilius eluuntur & dissolvuntur viscida, tolluntur obstructions, infensi denum humores ad exitum parantur, & per emunctoria proclivis sunt. Quod noxium est expellit, & secretiones aliquo peritus reatant. Epileptice beneficio coqui humores, sanguinem expurgari, heterogenea subigi ac per urinas aut sudores expelli ferè omnes experimur. In synochis quibusdam plethora imminuitur, sanguis atteritur. Quam fluxilis ex his febribus evadat monstrant sudores critici. Plethoram vero indicant narium hæmorrhagie quarto vel septimo die contingentes, quæ est crisis species in junioribus frequentior. Hæret in primis visus aliisve abdominis visceribus viscida materia Teriaria aut quartana auxilio dissolvitur, inciditur. Quidam suspicantur in urâque sanguinem astrico corporis habitu ad interiora refluxum, ex morâ & congectione ferum suppeditare, quod viscida illi materiæ eluenda interfervit, unde etiam frigus quartanarius longius ob majorem humoris tenacitatem. Furibilibus in interitibus ipsâ vellicatione ac fermentatione, humorum, lymphæ præsertim, affusionem provocat, ut materiâ illa noxia temperetur, eluatur, & per varios viscerum motus exprimitur, ut contingit in biliosis febribus cum hinc sum natura allequitur. Quin necessaria fit materia humoris evacuatio ex indole ipsius patet, ardore enim atque etiam excoitationes insignes tunc in faucibus ab hujus generis vomitu, cum in intestino recto ab ejusmodi diarrhæis eveniunt. Ubi lymphæ acris & ad lagnationes prona partis alicuius erosionem minatur, vides febres catharrhalis distas excitari, quæ leni & lenitate commotione, ac regulari, lympham attenuant, quapropter ferose partes per diaphores in paulatim excluduntur. Sic abstersâ & dissipatâ materia prævertitur saniosa & ichorosa ulceratio brevi phæcolâ putredine excipienda. Sunt etiam qui opinentur febrem heclicam que ex febrili ita & ulcere visceris cuiuspiam oritur, assidua longaque, & moderatè eadem febrium agitatione ad abstergendum mali labem, ad ea quæ exacerbant dissipanda & educenda conferre. Sic corruptionem imminuentem quæ licet arceri & sumoveri dicat. Jam in exanthematicis febribus, puta petechialibus, purpuratis & similibus, huc spectat motus sanguinis interior ut à centro ad peripheriam humorum peccans expellatur. In his cæterisque morbis ubi humor ad cutem vergit, repercutientia ministrare artis & artificis efficitur dedecus. Quæ verò humoris partem distrahere & aliò ducere valent, nonnisi cum summa prudentiâ adhibenda sunt. Notandæ imprimis variolæ, morbilli longe graviores. In utroque morbo inflammatio, in illo magis peccabilis. Per duos tres-ve priores dies, quod est separationis materiæ tempus particule inflammatae digeruntur coquanturque, nimirum plerumque febris ope, quæ tunc præcipue dominatur. Ille deinde particula in habitu corporis ablegantur, ubi eas maturari necesse est, quod ut fiat febri auxilio opus est, quæ puri conficiendo inservit, per exiguis cutis abscessus eruptio. Multum in hoc morbo natura potest, quæ sibi permittit sepe negotium suum suo tempore exequitur, materiamque debito ordine ac viæ fecerit, tum etiam expellit, ut (in junioribus præsertim vegetisque temperaments) nostrâ ope nostris artificibus atque auxiliis non indigeat, vis viribus optime instructa, suis opibus locuples suo denique ingenio satis edocta, ut medici in cognitione variarum versatissimi verbis utar. Non autem debet nisi sensum lentoque gradu fieri separatio ut opportunus ad universalem quandam deveniat desumptionem. Nec nimium assurgat nec intemptivè minatur ebullitio. Cum autem morbus ad alteram periodum pervenit, hoc est expulsiōnis tempus, moderatus calor decet, mediumque quoddam inter extrema ut priori tempore tendendum est. Frigus quidem pustularum eruptioni prorsus nocet. Nec vero minus calor nimis variis modis expulsiōnis inchoatæ infensus. Habet in variolis conspicuam inflammationis speciem, quæ tunc in papillis cutis sedem habet. Hujus generalem theoriam desideras? Finge animo sanguinem ad partem affectam propulsum uberius, ut stagnantis portiones putredo præcauent. Nempe curo arteriolas in minimis moratus canalibus, puta reticularibus arteriarum ramusculis, vel lymphaticorum arteriorum initiis, à fortiori reliqui croris motu atteritur. A sanguine tum hærente tum copiosius affluente morbo. Calor ab agitatâ quaquaversum hujusce particulis. Hic pro fluxu sitit etiam minuiuscula via subire apta est. Inde rubor exquisitus ei plane similis quem arte factæ injectiones exhibent, ex scilicet in quibus liquor ad ultimos usque vasorum fines, non ex tunc cepit lymphaticis arteriis, se infusivum. Cum autem hic per fibras tenas adeoque sensu equivoquantas trajiciatur sanguis, dolor inde vehemens sequatur necesse est. Ille si feriente continuo arteriarum pulsu augetur, acuitur, & pulsatorius redditur. Præ tensione enim vel leves divisiones consensuum ingentium vim habent. Sic coagulatus sanguis paulatim resolvitur, eluitur quod corruptum est, & à curore præterlabente penitus arripitur discutiturque. Ablati tenuioribus & acrioribus particulis, quæ crassior sanguinis portio superest, fert attrita & subacta tandem in pus convertitur. Est autem nulla sit inflammatio in quâ sanguinis motus intensior quamdam febrem speciem non exhibeat, hæc vero multo insignis & validius fe exercit, si sanguinis flatus in interioribus partibus five visceribus contingat. Tunc enim majori motuum apparatu opus est, unde graviora symptomata. Ita discutienda stasi sanguinis in hepate, in splene, in pleura, in pulmonibus, in cerebri meningibus & aliis locis apte sunt & utiles inflammatorie febres, ex variis partibus quarum occasione nascuntur, nomina singularia mutata. Quò majus autem periculum, eò vehementiores motus ut in febribus persistentibus atque ipsa peste, animadvertas.

MAGIS ac magis elucescat corporis mechanismus, si febrium quas in exemplum attulimus naturæ & effectibus periodorum atque etiam crissum accuratior notitia subjungatur. Periodi nomine venit circuitus sive ambitus quidam quo temporis portio aut res quæpiam circumscribitur, ita ut ab antecedentibus & consequentibus distinguatur. Sic periodus in febribus vocatur tota illa duratio que universalem febrem ab initio ad finem atque, & ipsos adeo paroxysmos comprehendit, ejusmodi est in acutis duratio per septenos, etiam lecutâ & tertâ quævis repetitis dies; nec verò universis illi tantum ambitus seu duratio, sed etiam ipsi paroxysmi quo breves periodos vocare liceat, definita tempora observant. Quid enim aliud fuit paroxysmi nisi itæ commotiones modò quietis modò interpositis diebus se subsequentes? Porrò constat illos isdem hodie aut saltem quàm proximè ad eadem diutius aut tardius, pro variâ ægrotationum naturâ aut diversâ animi temperate recurrere; eorum vehementia remittit vel duratio brevitur. Tam regulares, tam ordinatas motuum series à mechanicis legibus pendere manifestum est. Nimirum in Phisicis ut effectus quidam producat certa causæ agentis desideratur vis ac proportio, & determinatio motuum numero opus est ac proinde definito tempore quo motus illi absolvantur. Sic in inflammationibus ut certa sanguinis qui in vasis flagrat portio dissolvatur, eluatur, potentia certa & motuum quantitas necessaria est, quibus sanguis ad affectum partem impulsus eam liberet & ab obstructione vindict. Demonstrat autem experientia septem diebus hoc plerumque peragi ope illorum sanguinis circuitum qui per hoc tempus sunt. Hinc septimo die acutæ & inflammatorie febres folvi consueverunt. Ita variolis, morbillis, petechiis, purpurâ ut materiâ acris caustica aliarum partium quas sanguis suppeditat admittit temperetur, & sic ad secretionem & per habitum corporis excretionem reddatur idonea, certum temporis spatium desideratur, quod separationis tempus nuncupari jam diximus, scilicet tres circiter dies. His elapsis materia peccans ab internis ad exteriora progreditur. Est etiam sua pustularum maturatio, de quâ jam supra, definita periodus. Idem dicas de misfmate pestilenti febrium contagiosarum materiâ, cujus correctio & evacuatio temporis mensuram & motuum quantitatem sufficientem postulat. Insignia vero morborum periodorum exempla habemus in hæmorrhagiâ de quâ dicemus infra, in arthritis, & aliis. Potest autem illud in universum de ejusmodi morbis animadverti, mechanicas humorum commotiones, quæ vis affectibus provocandis sunt idoneæ, tum præcipue vim suam exercere cum in flata periodorum incidunt tempora; exempli causa hæmorrhagia periodice consueto tempore ex leviori causâ facilius quam extrâ illud à violentiori excitabitur. Magnam cum periodis affinitatem habet critica theoria; si enim flatus sint morborum decursus, cur non & solutiones? nempe cum viscosus humor illi alterari nequit, ut cum reliquis jungi debeat & locari possit, cum expelli necesse est. Tunc variis præparatur motibus ut illæ noxæ per crism, vel lentius, quod per lymphaductum, foras amandetur. Sic præparatur humorum ad naturâ evictum dicti coctumque vocat Hippocrates. Crisis ergo que quidem morbi judicationem quamlibet generatam sumptibus significat, strictè accepta pro felici morbi solutione habetur. Est autem evacuatio sufficiens & legitimo tempore contingens peccantis materiæ, quæ cocta, id est ætatem antea ritè preparata fuit. Hæc evacuatio per certa corporis emunctoria peragitur. Solemnes vis sive per sudores, alvum, urinam, putum, hæmorrhagiam, abscessum. Suis quæque species dignoscitur & prænotatur signis. Hæc, inquires, quoad Hippocraticam regionem & ætatem valent, nunc obsoleverunt. Responsum hæc è Baglivio, qui crissum infrequentè & mali successus causam ex eo deducit quod humores per diversas remediōrum seditiones distracti non possint ad effectum desumptionis negotium statò tempore disponi. At verò ætatemque speciem habemus spontaneam evacuationem, quæ statis contingit temporibus, & corpori levando intervient. In pleuræ morborum acutorem in quibus liquorum ingnis est fermentatio, certis diebus paroxysmi inflantur, hos vero sequuntur quedam evacuationes. In tertianis intermittentibus & conituis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac pōde febris mitior. At increbescit die tertio, & sub paroxysmi finem fit evacuatio que sæpe in suis febribus que paroxysmi exacerbantur diebus imparibus id contingere vides, quibus violentiores motus & graviora sunt symptomata. Scilicet primo die sanguis minori motu concitatur, ac p

Ergò multis in morbis elucescit corporis mechanismus.

M. Claudius Brunet.
M. Ludovicus de Santeul.
M. Emmanuel Mauricius du Verney, Actus Præses.

Mr. Raymundus - Jacobus Finot.
M. Philippus - Bernardus de Bordegayre.
M. Jacobus - Simon Gilles de la Rivière.

Typis J. QUILLAU, Universitatis & Facultatis Medicinæ Typographi